

## **Floroglucinolo - A03AX12**

Antispastico, miolitico ad azione diretta. Disponibile in Italia dal 1962.

*Nessuno studio specifico è disponibile in letteratura in rapporto all'uso nel 1° trimestre della gravidanza umana, non sono disponibili neppure studi su animali di laboratorio.*

**Effetti feto-neonatali:** non effetti negativi per madre e/o neonato in seguito all'uso nell'ultimo periodo della gravidanza nella minaccia di parto prematuro e nel travaglio di parto (Morin et al 1964, Plasse et al 1964, Foti et al 1971).

**Scheda tecnica:** "non è prevista nessuna restrizione d'uso in caso di gravidanza".

**Conclusioni:** Non sono disponibili in letteratura studi specifici sull' uso del Fluorglucinolo nel primo trimestre della gravidanza umana. In caso di avvenuta esposizione un aumento del rischio riproduttivo di base non è ipotizzabile, considerata la mancata segnalazione di anomalie nel lungo periodo di commercializzazione e l'assenza di azione teratogena sugli animali di laboratorio, (documentazione fornita dalla ditta produttrice per la registrazione ministeriale, non disponibile nelle banche dati).

### **Bibliografia**

- **Morin P, Hamelin R, Grepinet J. Presse Med 1964;52:3121** in Onnis A, Grella P, Marchesoni D. I Farmaci in Gravidanza. Piccin Ed Padova 1983.
- **Plasse G, Goirand R, bossi. Provence Med 1964;10:353** in Onnis A, Grella P, Marchesoni D. I Farmaci in Gravidanza. Piccin Ed Padova 1983.
- Foti A, Penazzo S, Volpe L. Use of a new spasmolytic agent (Spasmex) in obstetrics. Minerva Ginecol 1971;23:480-488.

Rivisto  
Ottobre 2005